5

Observation sur une plaie faite au bas ventre par un coup de corne de boeuf. par Mr. Fritse medecin à Dillenbourg. traduit de l'allemand.

une pauvre femme, d'un temperament délicat mais d'ailleurs bien portante, mere de plusieurs enfants, recut étant dans le 6e mois de sa grossesse un coup de corne de boeuf dans le bas ventre. la corne de l'animal pénétra dans la région hypogastrique droite, à 3 pouces de distance de la ligne blanche et blessa le corps de l'uterus. son mari la voyant dans cette triste situation courut à son secours et voulant la débarasser de l'animal fit malgré lui une nouvelle plaie de deux pouces de longueur en ~~voulant~~ retirant la corne ~~qui étoit~~ enfoncée dans le ventre. cette seconde plaie étoit dans la direction de la ligne blanche et compliquée du déchirement des parties et de perte de substance, ~~et~~ formant avec la 1re ~~plaie~~ une seule division. il survint une hémorrhagie considerable, le bras droit du foetus passoit à travers la plaie de l'uterus et des teguments. le dr. Fritse qui fut appelé au secours de cette femme, ne put venir que 10 heures après l'accident. convaincu de la nécessité de faire l'operation césarienne pour

ARC 57
n° 29

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE - BIBLIOTHÈQUE

lui sauver la vie ~~de cette femme~~, il la
fit 17 heures après la blessure reçue.
~~cette femme~~ la malade située convenablement et
maintenue par 4 aides, mr. Fritsse se
placa du coté ~~droit~~ gauche, afin d'avoir
le libre usage de sa main droite. il
introduisit d'abord le doigt index de la
main gauche dans la partie de la plaie
où la corne du boeuf avoit pénétré dans
la cavité abdominale, ~~et qui~~ étoit à 3
pouces de distance de la ligne blanche
et à égale distance de l'anneau ingui-
-nal. après avoir agrandi cette plaie avec
le bistouri, jusqu'au point de pouvoir in-
-troduire un second doigt, celui du milieu,
il incisa le muscle droit et le péritoine de
la longueur de 3 pouces, en suivant une ligne
droite dirigée de bas en haut vers le nombril. prenant
ensuite l'instrument de la main gauche, il
incisa inférieurement, de l'étendue d'environ
un pouce, du coté de l'anneau inguinal
droit. cette ouverture qui avoit 4 pouces
de longueur n'étant pas suffisante pour
permettre l'extraction du foetus, il examina
l'état de l'uterus et vint à bout d'introduire
peu à peu le doigt index de la main droite
dans sa cavité à travers la ~~plaie~~ déchirure
qui étrangloit fortement le bras du foetus.
il apprit par cette introduction du doigt dans

l'uterus que le placenta étoit attaché au coté droit de ce viscere et non a son fond. bien convaincu alors qu'il n'y avoit aucun danger à inciser le fond de l'uterus, il introduisit le 2e et le 3e doigt entre le corps de l'uterus et l'enfant, coupa le corps de ce viscere et son fond dans l'étendue de 4 pouces. le foetus fut alors extrait par cette ouverture ~~non sans~~ avec difficulté et avec beaucoup de douleur pour la malade. il en fut de même de l'extraction du placenta qui étoit très adhérent. cela fait, Mr. Fritze porta sa main dans l'uterus pour en oter les caillots de sang. à peine la tete de l'enfant fut elle entre les levres de la plaie des tegumens qu'il se fit une protrusion d'une partie du colon. un aide le reduisit et le maintint en place jusqu'à ce que toute l'opération fut achevée pendant laquelle la malade ne perdit pas plus de 7 onces de sang. on fit ensuite quelques points de suture entrecoupée à la plaie du bas ventre, et la malade fut mise à la diete. quelques heures après les lochies parurent; le lendemain et les jours suivans, le ventre se tuméfia, devint douloureux et la malade fut prise de nausées et d'eructations.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

4

ces accidents diminuerent par l'usage des lavemens. le 4e jour la fievre étoit assés forte, et l'on ota l'appareil pour la 1ere fois, les levres de la plaie étoient légere-ment enflammées, mais bien rapprochées. la boisson ordinaire de la malade étoit une tisanne legerement acidulée, quelquefois une infusion de fleurs de camomille, ou de quinquina et de tems en tems un peu de liqueur anodyne d'hofman. le 5e jour de l'opéra-tion l'état de cette femme étoit bon à tous égards, peu de fievre, souplesse du ventre, point d'alteration, un peu de moiteur. le 8e jour on s'apercut que les levres de la plaie étoient coupées par les points de suture, on ota les fils, on se servit d'emplastres agglutinatifs. le 24e jour il se forma un leger abcès entre les tegumens et le muscle droit. ce ne fut que le 35e ~~jour~~ que cette femme fut parfaitement guérie et put se promener dans la cham-bre. ~~cette femme~~ elle continua de se bien porter, reprit ses travaux rustiques, sans éprouver le plus leger inconvénient. un an après, elle devint grosse. et pen-dant les 4 premiers mois de cette grossesse

elle n'éprouva que les incom-
~~-~~modités ordinaires aux
femmes enceintes. mais à la ~~ce~~
fin de ~~ce~~ terme de 4 mois, la cicatrice
devint beaucoup plus mince que
le reste des téguments et il s'y forma
une tumeur qui devint peu à peu
considérable. le ventre qui étoit
pendant et comme en besace
fut soutenu par un bandage qui
avoit son point fixe sur les épaules.
enfin elle accoucha par les voies natu-
-relles et très aisement d'un en-
-fant mort, au terme ordinaire
de la grossesse. lorsque l'accoucheur
arriva, il y avoit deja six heures
que le fœtus étoit sorti, mais le placen-
-ta étoit dans l'uterus. elle éprouva
~~des douleurs et de~~ fréquentes syncopes
et mourut une heure après l'arrivée
de l'accoucheur.
son corps fut examiné avec soin et l'on
vit que l'abdomen étoit très distendu.
la cicatrice de la plaie qui avoit été faite
par l'instrument tranchant étoit très
solide, mais celle de la plaie faite avec
déchirement par la corne du bœuf étoit
très mince et avec tuméfaction. il
y avoit dans la cavité abdominale en-
-viron 12 livres de sang épanché, en
partie fluide, en partie coagulé.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

6

le péritoine adhéroit fermement aux deux cicatrices. l'épiploon avoit aussi contracté de fortes adhérences avec le péritoine dans ces mêmes endroits. une portion du cœcum étoit aussi adhérente avec le péritoine. les veines de l'uterus et surtout celles du coté droit, vers l'ovaire étoient très dilatées. il y avoit un caillot de sang situé entre l'ovaire droit et la partie latérale du fond et du corps de l'uterus. le péritoine qui se réflechit sur ces parties étoit sou-levé et distendu par ce caillot. cette membrane formoit une espece de sac avec une ouverture à travers laquelle le sang s'etoit fait jour ~~pour s'épancher~~ dans la cavité du ventre. en nettoyant ces parties, on vit que plusieurs des veines dilatées qui se distribuent dans la substance de l'uterus, s'ouvroient dans ce sac. l'endroit où l'incision avoit été faite à la matrice, pouvoit à peine etre reconnu: la cicatrice étoit très solide. mais celle de la plaie faite au même viscere par la corne du boeuf étoit beaucoup plus mince. le placenta étoit encore si fermement attaché à l'uterus,

Qu'il fut difficile de l'en ex-
-traire. lorsqu'on l'eut oté,
on détacha la matrice, on la
remplit d'eau, mais il ne s'en
échappa pas une seule goute à travers
sa substance. les viscères du bas ventre
étoient parfaitement sains. il est
évident que l'épanchement de sang dans
le ventre a été la cause de la mort
de cette femme. est-il possible que
l'opération césarienne, ou plutot que
la plaie faite à l'uterus par la corne
du boeuf un an auparavant ait été
la cause occasionelle de cet épanchement
sanguin ?

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

6

N. 29